arXiv:0809.1337v1 [math.NT] 8 Sep 2008

Remarques sur un article récent de B. Poonen

J-L. Colliot-Thélène

8 septembre 2008

Résumé : B. Poonen a récemment exhibé des exemples de variétés projectives et lisses de dimension 3 sur un corps de nombres qui n'ont pas de point rationnel et pour lesquelles il n'y a pas d'obstruction de Brauer–Manin après revêtement fini étale. Dans cette note, je montre que les variétés qu'il construit possèdent des zéro-cycles de degré 1.

Summary : B. Poonen recently produced smooth threefolds over a number field which do not have a rational point but have no Brauer–Manin obstruction even after descent to a finite étale cover. In this note I show that the varieties he produces have zero-cycles of degree 1.

Mots-clés : points rationnels, zéro-cycles, principe de Hasse, obstruction de Brauer–Manin

Keywords : rational points, zero-cyles, Hasse principle, Brauer–Manin obstruction

Mathematical Subject Classification (MSC 2000) Primary : 14G05, 14G25 11G35. Secondary : 14J20, 14F22.

1 Introduction

Soit k un corps de nombres. Dans son article [10], B. Poonen construit des exemples de variétés projectives et lisses de dimension 3 sur k qui ont les propriétés suivantes : elles ont des points dans tous les complétés de k, il n'y a pas d'obstruction de Brauer–Manin à l'existence d'un point rationnel, mieux, il n'y a pas d'obstruction de Brauer-Manin après descente par revêtements finis étales, et cependant les variétés ne possèdent pas de point k-rationnel. C. Demarche [5] vient de montrer que ceci implique qu'aucune obstruction de

descente sous un groupe algébrique ne saurait rendre compte de l'inexistence de point rationnel. La situation est donc tout à fait différente de celle de l'exemple historique de Skorobogatov ([12], [9]).

Dans [3] j'ai conjecturé que pour toute variété projective, lisse, géométriquement connexe sur un corps de nombres, l'obstruction de Brauer-Manin à l'existence d'un zéro-cycle de degré 1 est la seule obstruction.

Dans cette note je montre que la conjecture vaut pour les variétés construites par Poonen : elles ont toutes un zéro-cycle de degré 1. La question reste entière pour l'exemple de Skorobogatov.

Au paragraphe 1 je rappelle brièvement la construction des variétés. Au paragraphe 2 je donne une démonstration alternative du calcul du groupe de Brauer de ces variétés. Le résultat de ce calcul permet de montrer ([10]) qu'il n'y a pas d'obstruction de Brauer–Manin à l'existence d'un point rationnel, et *a fortiori* pas d'obstruction de Brauer–Manin à l'existence de zéro-cycles de degré 1. Au paragraphe 3, logiquement indépendant du précédent, j'établis l'existence de zéro-cycles de degré 1.

Cet article a été conçu à l'occasion d'exposés donnés en avril 2008 à l'université Emory (Atlanta, Géorgie).

2 Les variétés

Soit k un corps de caractéristique nulle. Les variétés considérées dans [10] s'insèrent dans le diagramme suivant, que nous allons détailler.

$$\begin{array}{ccc} X & \rightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ C \times \mathbb{P}^1 & \rightarrow & \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ C & \rightarrow & \mathbb{P}^1 \end{array}$$

Dans ce diagramme, toutes les variétés sont des k-variétés projectives, lisses, géométriquement connexes. La variété C est une courbe. Les flèches verticales inférieures sont données par la projection sur le premier facteur. La variété V est de dimension 3, elle est fibrée en coniques sur $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$. Le lieu de ramification de cette fibration (le lieu où la conique fibre est singulière) est une k-courbe projective, lisse, géométriquement intègre $Z_1 \subset \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$. La projection sur le premier facteur $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ induit un revêtement ramifié $Z_1 \rightarrow \mathbb{P}^1$, le lieu de ramification dans $\mathbb{P}^1$ ne contient pas le point $\infty \in \mathbb{P}^1(k)$.

Le morphisme $C \to \mathbb{P}^1$ est un revêtement ramifié, son lieu de ramification dans $\mathbb{P}^1$ ne rencontre pas le lieu de ramification de $Z_1 \to \mathbb{P}^1$.

La partie verticale gauche du diagramme est obtenue par rétrotirette à partir de la partie verticale droite (produits fibrés via le morphisme $C \to \mathbb{P}^1$).

Pour tout point schématique $w \in \mathbb{P}^1$, de corps résiduel $k(w)$, la fibre V_w est une surface géométriquement intègre sur $k(w)$ qui contient un ouvert affine d'équation

$$y^2 - az^2 = P_w(x)$$

avec $a \in k \setminus k^2$ et $P_w(x) \in k(w)[x]$ un polynôme non nul, de degré 4 en la variable x, séparable pour w non dans le lieu de ramification de $Z_1 \to \mathbb{P}^1$.

Le lieu de dégénérescence de la fibration en coniques $X \to C \times \mathbb{P}^1$ est l'image inverse Z de Z_1 par $C \times \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$. Il est montré dans [10] (Lemma 8.1) que $Z \subset C \times \mathbb{P}^1$ est une k-courbe projective, lisse, géométriquement intègre.

La description des fibres de l'application composée $V \to \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$ (première projection) montre que l'on a :

Proposition 2.1. *Sous les hypothèses faites ci-dessus, pour tout point schématique P de C, la fibre $X_P/k(P)$ du morphisme $X \to C$ au point P est une $k(P)$-variété géométriquement intègre.*

3 Leur groupe de Brauer

Le résultat suivant est établi dans [10] au moyen d'une étude de l'action du groupe de Galois sur le groupe de Picard géométrique de X. Nous proposons une démonstration un peu plus courte. La différence entre la démonstration de [10] et la présente démonstration est essentiellement la même que celle entre les propositions 7.1.1 et 7.1.2 de [13].

Proposition 3.1. *Sous les hypothèses ci-dessus, la flèche naturelle de groupes de Brauer $\mathrm{Br}\, C \to \mathrm{Br}\, X$ est un isomorphisme.*

Démonstration. Notons $B = C \times \mathbb{P}^1$. La fibration en coniques $X \to B$ est dégénérée en un seul point de codimension 1 de B, correspondant à la courbe géométriquement intègre Z.

Soit η le point générique de B et X_η la fibre générique de $X \to B$. C'est une conique lisse.

De façon générale, étant donné un k-morphisme plat $X \to B$ de k-variétés lisses géométriquement intègres, on dispose d'un diagramme commutatif de suites exactes de groupes de cohomologie étale :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \to & \operatorname{Br} B & \to & \operatorname{Br} k(B) & \xrightarrow{\oplus_x \partial_x} & \bigoplus_{x \in B^{(1)}} H^1(k(x), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow e_{y/x}.\mathrm{Res}_{k(x)/k(y)} \\ 0 & \to & \operatorname{Br} X & \to & \operatorname{Br} X_\eta & \xrightarrow{\oplus_x \partial_y} & \bigoplus_{x \in B^{(1)}} \bigoplus_{y \in X^{(1)}, y \to x} H^1(k(y), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}). \end{array}$$

Dans ce diagramme, x parcourt les points de codimension 1 de B, et y parcourt les points de codimension 1 de X qui ne sont pas situés sur X_η. Pour $y \in X$ d'image $x \in B$, on a l'inclusion des corps résiduels $k(x) \subset k(y)$. L'entier $e_{y/x}$ est l'indice de ramification. Les flèches ∂ sont les flèches de résidu.

On peut extraire un tel diagramme des exposés de Grothendieck sur le groupe de Brauer ([7], voir GB II, Cor. 1.10, GB III, Prop. 2.1, GB III, Thm. 6.1). Pour plus de détails, voir par exemple [2, §3] et [6, Chapter 6]. La démonstration combine les suites de localisation, leur fonctorialité et le théorème de pureté pour le groupe de Brauer.

Dans la présente situation, la fibre générique est une conique sur $k(B)$. Soit $\beta \in \operatorname{Br} k(B)$ la classe de l'algèbre de quaternions associée à cette conique. Cette classe β est non triviale, elle admet un unique résidu non trivial, au point générique de Z, et la classe correspondante est la classe de $a \in k^*/k^{*2} = H^1(k, \mathbb{Z}/2) \subset H^1(k(Z), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$.

Pour la conique X_η sur $k(B)$ sans point rationnel, on dispose de la suite exacte classique (cf. [12] p. 138)

$$0 \to \mathbb{Z}/2.\beta \to \operatorname{Br} k(B) \to \operatorname{Br} X_\eta \to 0.$$

Le diagramme ci-dessus montre alors que l'application $\operatorname{Br} B \to \operatorname{Br} X$ est injective.

Soit $\alpha \in \operatorname{Br} X$. L'image de α dans $\operatorname{Br} X_\eta$ est l'image d'un élément $\gamma \in \operatorname{Br} k(B)$, défini à addition près de β.

Le lieu de ramification de $X \to B$ est réduit à l'unique courbe $Z \subset B$. Ceci implique que pour $x \in B^{(1)}$ différent du point générique de Z, et y l'unique point de $X^{(1)}$ au-dessus de x, qui définit une conique lisse donc géométriquement intègre sur le corps $k(x)$, la flèche $e_{y/x}.\mathrm{Res}_{k(x)/k(y)} = \mathrm{Res}_{k(x)/k(y)} : H^1(k(x), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \to H^1(k(y), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ est une injection. Quant à la flèche $e_{y/x}.\mathrm{Res}_{k(x)/k(y)} = \mathrm{Res}_{k(x)/k(y)}$ associée au point générique de Z et à l'unique y au-dessus de ce point, son noyau est le noyau de la flèche de

restriction $H^1(k(Z), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \to H^1(k(Z)(\sqrt{a}), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$. Ce noyau est d'ordre 2, engendré par la classe de a dans $k^*/k^{*2} = H^1(k, \mathbb{Z}/2)$.

Du diagramme ci-dessus on conclut que les résidus de γ aux points autres que le point générique de Z sont nuls, et qu'au point générique de Z le résidu est soit trivial soit égal au résidu de β. Quitte à remplacer éventuellement γ par $\gamma + \beta$, ce qui est loisible, on voit que $\gamma \in \operatorname{Br} k(B)$ est dans l'image de $\operatorname{Br} B$. Comme l'application $\operatorname{Br} X \to \operatorname{Br} X_\eta$ est injective, ceci achève de montrer que l'application $\operatorname{Br} B \to \operatorname{Br} X$ est un isomorphisme.

Le groupe de Brauer de la droite projective sur un corps est égal à l'image du groupe de Brauer de ce corps. De $B = C \times \mathbb{P}^1$ on déduit que $\operatorname{Br} C \to \operatorname{Br} B$ est un isomorphisme. Ceci achève la démonstration de la proposition. □

4 Existence de zéro-cycles de degré 1

Théorème 4.1. *Soit k un corps de nombres. Soient $V \to \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, $C \to \mathbb{P}^1$ et $X \to C \times \mathbb{P}^1$ comme ci-dessus. Faisons les deux hypothèses :*

(i) la fibre (lisse) V_∞ de la fibration composée $V \to \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$ (première projection) a des points dans tous les complétés de k ;

(ii) il existe un k-point P de C dont l'image par $C \to \mathbb{P}^1$ est le point ∞. Alors pour tout entier $n \geq 2g+1$, où g désigne le genre de C, la k-variété X possède un point dans un corps extension de k de degré n. En particulier X possède un zéro-cycle de degré 1.

Démonstration. Soit n comme dans l'énoncé. Le système linéaire associé au diviseur nP de C est alors très ample. Soit $C \hookrightarrow \mathbb{P}^N$ le plongement associé, et soit $\check{\mathbb{P}}^N$ l'espace projectif dual de $\mathbb{P}^N$.

La variété d'incidence $W \subset \mathbb{P}^N \times \check{\mathbb{P}}^N$ définie par l'annulation de la forme bihomogène $\sum_{i=0}^N X_i Y_i$ est un diviseur très ample. La projection $W \to \check{\mathbb{P}}^N$ définit un fibré (lisse) en espaces projectifs $\mathbb{P}^{N-1}$.

Soit $W_Z \subset Z \times \check{\mathbb{P}}^N$ l'image inverse de la correspondance d'incidence via le morphisme composé

$$Z \times \check{\mathbb{P}}^N \to C \times \check{\mathbb{P}}^N \to \mathbb{P}^N \times \check{\mathbb{P}}^N.$$

C'est un fibré (lisse) en espaces projectifs $\mathbb{P}^{N-1}$ au-dessus de la courbe Z, qui est projective, lisse et géométriquement intègre. Ainsi W_Z est projectif, lisse et géométriquement intègre.

Le même argument montre que l'image inverse $W_C \subset C \times \check{\mathbb{P}}^N$ de la correspondance d'incidence est une k-variété projective, lisse, géométriquement intègre.

Les morphismes naturels $W_Z \to W_C \to \check{\mathbb{P}}^N$ sont des morphismes propres dominants et finis – ils sont quasi-finis car la courbe C engendre $\mathbb{P}^N$ projectivement.

La proposition 2.1 et un énoncé bien connu ([4, I, p. 43], [11, Thm. 1], [1, §3.2]) impliquent l'existence d'un ensemble fini S de places de k tel que pour toute extension finie L de k et toute place w de L non située au-dessus d'une place de S, l'application $X(L_w) \to C(L_w)$ est surjective.

Pour toute place v de k, la fibre (lisse) X_P du morphisme $X \to C$ au-dessus du k-point P possède un k_v-point lisse. Ceci implique que pour toute extension finie L/k_v, l'image de l'application induite $X(L) \to C(L)$ contient un voisinage ouvert de $P \times_{k_v} L$ pour la topologie v-adique sur $C(L)$.

Il existe un hyperplan $H_0 \in \check{\mathbb{P}}^N(k)$ qui découpe exactement le diviseur nP sur C. Soit v une place de k. Tout hyperplan $H \in \check{\mathbb{P}}^N(k)$ qui est suffisamment proche de H_0 pour la topologie v-adique découpe sur la courbe C une somme de points fermés qui lorsque l'on passe de k à un complété k_v donnent des points sur diverses extensions finies L de k_v de degré au plus n, points qui sont proches de $P \times_k L$ pour la topologie v-adique sur $C(L)$. Rappelons qu'un tel corps local k_v (de caractéristique nulle) n'admet qu'un nombre fini d'extensions L/k_v de degré au plus n.

Le théorème d'irréductibilité de Hilbert avec approximation faible (cf. [8], Prop. 3.2.1), appliqué à l'ensemble fini S de places et au revêtement fini de variétés géométriquement intègres $W_Z \to \check{\mathbb{P}}^N$, composé de $W_Z \to W_C \to \check{\mathbb{P}}^N$, permet alors de trouver un point fermé $M \in C$, de degré n sur k, tel que la fibre $X_M/k(M)$ soit une surface de Châtelet lisse, possède des points dans tous les complétés de $k(M)$ (ceci par combinaison des trois paragraphes précédents) et que de plus le schéma $Z_M = Z \times_C M$ soit intègre. Mais ceci signifie que la surface de Châtelet correspondante admet une équation affine $y^2 - az^2 = P(x)$ avec $P(x) \in k(M)[x]$ irréductible de degré 4. L'un des principaux résultats de [4], le théorème 8.11, assure que le principe de Hasse vaut pour une telle surface. Ainsi $X_M(k(M)) \neq \emptyset$, *a fortiori* $X(k(M)) \neq \emptyset$.

$\square$

Remarque 4.2. Supposons $C = \mathbb{P}^1$. Dans ce cas on peut prendre $n = 1$, et on obtient $X(k) \neq \emptyset$. On a mieux. Comme les surfaces de Châtelet d'équation affine $y^2 - az^2 = P(x)$ avec $P(x)$ irréductible satisfont l'approximation faible ([4, Thm. 8.11]), une variante immédiate de l'argument établit l'approximation faible pour X : l'ensemble $X(k)$ est dense dans le produit des $X(k_v)$. L'argument est un cas particulier d'un théorème général (Harari, [8], Thm. 4.2.1).

Remarque 4.3. Dans [3], outre la conjecture sur l'existence de zéro-cycles de degré 1, j'ai proposé une conjecture sur l'application diagonale de groupes de Chow de zéro-cycles $CH_0(X) \to \prod_v CH_0(X_v)$. Dans une série d'articles (voir la bibliographie de [3]), des versions de cette conjecture ont été établies pour des variétés fibrées en variétés de Severi-Brauer au-dessus d'une courbe. Il serait intéressant de voir si l'on peut pousser les arguments ci-dessus et établir la conjecture pour les familles $X \to C$ de surfaces de Châtelet considérées ici.

Références

[1] J-L. Colliot-Thélène, L'arithmétique des variétés rationnelles, Ann. Fac. Sci. Toulouse Math. (6) **1** (1992), no. 3, 295–336.

[2] J-L. Colliot-Thélène, Birational invariants, purity and the Gersten conjecture, in *K-Theory and Algebraic Geometry : Connections with Quadratic Forms and Division Algebras*, Bill Jacob and Alex Rosenberg ed., Proceedings of Symposia in Pure Mathematics **58.1**, Amer. Math. Soc. (1995), 1–64.

[3] J-L. Colliot-Thélène, Conjectures de type local-global sur l'image des groupes de Chow dans la cohomologie étale, in *Algebraic K-Theory* (1997), W. Raskind and C. Weibel ed., Proceedings of Symposia in Pure Mathematics **67**, Amer. Math. Soc. (1999) 1–12.

[4] J-L. Colliot-Thélène, J-J. Sansuc et Sir Peter Swinnerton-Dyer, Intersections of two quadrics and Châtelet surfaces, I, J. für die reine und angew. Math. (Crelle) **373** (1987) 37-107 ; II, ibid. **374** (1987) 72-168.

[5] C. Demarche, Obstruction de descente et obstruction de Brauer–Manin, prépublication, 2008.

[6] P. Gille et T. Szamuely, *Central Simple Algebras and Galois Cohomology*, Cambridge studies in advanced mathematics **101** (2006).

[7] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer, I, II, III, in *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, Advanced Studies in Pure Mathematics, Masson, Paris et North-Holland, Amsterdam, 1968.

[8] D. Harari, Méthode des fibrations et obstruction de Manin, Duke Math. J. **75** (1994) 221–260.

[9] D. Harari et A. N. Skorobogatov, Non-abelian descent cohomology and rational points, Compositio Math. **130** (2002) 241–273.

[10] B. Poonen, Insufficiency of the Brauer-Manin obstruction applied to étale covers, prépublication, arXiv : 08061312.

[11] A. N. Skorobogatov, On the fibration method for proving the Hasse principle and weak approximation, in *Séminaire de théorie des nombres de Paris 1988–1989*, éd.C. Goldstein, Prog. Math. **91**, Birkhäuser, Boston, 1990, 205–219.

[12] A. N. Skorobogatov, Beyond the Manin obstruction, Invent. math. **135** (1999) (2) 399–424.

[13] A. Skorobogatov, *Torsors and rational points*, Cambridge tracts in Mathematics **144**, Cambridge University Press, 2001.

Jean-Louis Colliot-Thélène
C.N.R.S., UMR 8628,
Mathématiques, Bâtiment 425,
Université Paris-Sud,
F-91405 Orsay,
France

courriel : jlct à math.u-psud.fr